



Wees steeds voorzichtig en waakzaam als je je kind een geneesmiddel toedient. [Hier](#) vind je enkele zaken waar je op moet letten en tips om geneesmiddelen goed te gebruiken bij kinderen.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof acetylcysteïne zijn **geneesmiddelen die slijmen verdunnen**.

Geef acetylcysteïne aan je kind bij **slijmhoest** (hoest waarbij je slijm (fluïmen) ophoest).



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

Niet alle vormen zijn geschikt voor je kind.

Besprek met je arts of apotheker welk geneesmiddel het meest geschikt is voor je kind.

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die acetylcysteïne bevatten. Je ziet er hoeveel acetylcysteïne ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast acetylcysteïne nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruikt mijn kind dit geneesmiddel? - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag mijn kind van dit geneesmiddel gebruiken?

Acetylcysteïne mag gebruikt worden bij **kinderen vanaf 2 jaar**.

- **Kinderen van 2 tot 7 jaar:**
 - **Vaste vorm** (granulaat): je kind mag **niet meer innemen dan 400 mg (milligram) per dag** (24 uur), te verdelen over 2 of 3 innames.
 - **Vloeibare vorm**: je kind mag **niet meer innemen dan 10 ml (milliliter), tweemaal per dag** (24 uur). **Er bestaan verschillende soorten siropen. Gebruik de vorm die geschikt is voor kinderen.**
 - **Ampullen voor aerosol**: één ampul per aerosolsessie, 1 tot 2 keer per dag gedurende 5 tot 10 dagen.
- **Kinderen ouder dan 7 jaar:**
 - **Vaste vorm**: je kind mag **niet meer innemen dan 600 mg (milligram) per dag** (24 uur), te verdelen over 1 tot 3 innames.
 - **Vloeibare vorm**: je kind mag **niet meer innemen dan 10 ml (milliliter), driemaal per dag, of 30**

ml in één inname (24 uur).

- Ampullen voor aerosol: één ampul per aerosolsessie, 1 tot 2 keer per dag gedurende 5 tot 10 dagen.

Op welk tijdstip gebruikt mijn kind dit geneesmiddel?

Geef je kind acetylcysteïne op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**.

Als je kind acetylcysteïne verschillende keren per dag neemt, zorg er dan voor dat doses **gelijkmatig** over de dag worden **verdeeld**.

Hoelang mag mijn kind dit geneesmiddel gebruiken?

Geef acetylcysteïne **zo kort mogelijk**. Als de **klachten van hoesten** niet meer hinderlijk zijn, **stop** dan met het gebruik van acetylcysteïne.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van acetylcysteïne zijn de volgende:

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- hoofdpijn;
- oorsuizen;
- hoge hartslag;
- toename van slijm in de longen;
- loopneus;
- braken, diarree, buikpijn, misselijkheid;
- ontsteking van de mond;
- jeuk;
- koorts;
- lage bloeddruk.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je kind last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag mijn kind zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Goed idee dat je de behandeling wil stoppen. **Ja**, je kind kan stoppen met het gebruik van acetylcysteïne. **Als je symptomen niet meer hinderlijk zijn, doe je dit best zo snel mogelijk.**



Wat moet ik doen als mijn kind een dosis is vergeten of te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt?

Wat als mijn kind een dosis is vergeten?

Geef de volgende dosis acetylcysteïne op het volgende voorziene tijdstip.

Geef je kind **nooit een dubbele dosis** acetylcysteïne om een vergeten dosis in te halen.

Wat als mijn kind te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Je kind kan volgende klachten krijgen: misselijkheid, braken en diarree.



Mag mijn kind alles eten en drinken als het dit geneesmiddel gebruikt?

Ja, je kind mag alles eten en drinken als het acetylcysteïne gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op acetylcysteïne.



Waarop moet ik letten als mijn kind nog andere geneesmiddelen gebruikt?

Acetylcysteïne kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen.

Er zijn voor acetylcysteïne **geen mogelijk ernstige wisselwerkingen** bekend. De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als mijn kind nog andere gezondheidsproblemen heeft?

Geef acetylcysteïne niet aan je kind in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **maag- of darmzweer**.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van acetylcysteïne, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Hou dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 - 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

