

Acetylsalicylzuur + Vitamine C

Werkzame stof

Belangrijk om te weten

- Je loopt een **groter risico** om een **bloeding** te krijgen door het gebruik van acetylsalicylzuur.

Tijdelijke informatie

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof acetylsalicylzuur in een hoge dosering zijn **pijnstillers, ontstekingsremmers en koortsverlagers**.

Vitamine C (ascorbinezuur) speelt een rol bij de **immuuniteit**.

Gebruik acetylsalicylzuur + vitamine C bij

- **pijn**;
- **koorts**;
- **ontsteking**.

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmaInfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die enkel acetylsalicylzuur en vitamine C bevatten. Je ziet er hoeveel acetylsalicylzuur en vitamine C ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast acetylsalicylzuur + vitamine C nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.

Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

De **algemene dosering van acetylsalicylzuur** vind je terug bij [Acetylsalicylzuur bij pijn, ontsteking en koorts](#).

Je mag **niet meer acetylsalicylzuur innemen dan 4000 mg (milligram) (4 gram) per dag** (24 uur), tenzij je arts dit anders voorschrijft. Bij een ontsteking mag je **niet meer innemen dan 6000 mg (milligram) (6 gram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem acetylsalicylzuur + vitamine C **in tijdens of net na de maaltijd**, zo heb je minder risico op maag- of darmklachten.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je acetylsalicylzuur + vitamine C moet innemen.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Gebruik acetylsalicylzuur + vitamine C **zo kort mogelijk**. Als de **klachten** van pijn, ontsteking en/of koorts **verdwenen** zijn, **stop** dan met het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C.

Heb je ondanks het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C na 3 tot 5 dagen nog evenveel of zelfs meer last van klachten? Neem dan **contact op met je arts**.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden:

- oorsuizen;
- snellere en diepere ademhaling;
- klachten die wijzen op een allergische reactie zoals zwelling van het gezicht en de lippen of netelroos (jeukende bulten op je huid);
- rode huid met blaren en afschilfering, al dan niet samen met koorts en gewrichtspijn;
- ongewone bloedingen.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- diarree (enkel bij langdurig gebruik van hoge dosissen vitamine C).

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- maagzweer, darmzweer;
- bloedingen (let op voor bloed in de stoelgang en bij braken);
- netelroos (urticaria);
- verhoogde neiging tot bloedingen zoals na het trekken van een tand of tijdens de menstruatie (ongesteld zijn);
- misselijkheid, buikpijn, braken, diarree;
- loopneus;
- moeilijker kunnen ademen, zeker bij patiënten met astma.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).

Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Goed idee dat je wilt stoppen. **Ja**, je kan in één keer stoppen met het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C. Als de pijn, ontsteking en/of koorts verdwenen zijn, doe je dit **best zo snel mogelijk**.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis acetylsalicylzuur + vitamine C op het **volgende voorziene tijdstip**.

Neem **nooit een dubbele dosis** acetylsalicylzuur + vitamine C om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker** of bel het Antigifcentrum (070 245 245) .

Bij een **overdosering met acetylsalicylzuur** kan je volgende klachten krijgen:

- je voelt je duizelig;
- je hebt hoofdpijn en oorsuizingen;
- je hebt het gevoel dat je minder goed hoort.

Bij een **ernstige overdosering**

- krijg je koorts;
- je ademt sneller;
- je longfunctie vermindert;
- je glucosegehalte in het bloed verlaagt (hierdoor zal je je vermoeid en suf voelen);
- je kan in een coma geraken.

Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je acetylsalicylzuur + vitamine C gebruikt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je drinkt best geen alcohol als je acetylsalicylzuur + vitamine C gebruikt.

Alcohol versterkt het irriterend effect van acetylsalicylzuur, wat ervoor kan zorgen dat je last krijgt van je maag of je darmen.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je acetylsalicylzuur + vitamine C gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op acetylsalicylzuur + vitamine C.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Acetylsalicylzuur + vitamine C wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Als je zwanger bent, **neem dan geen acetylsalicylzuur + vitamine C zonder medisch advies**.

Het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C wordt **afgeraden tijdens de zwangerschap**.

Bij langdurig gebruik van hoge dosissen acetylsalicylzuur (meer dan 500 mg per dag) heb je een groter risico op een **miskraam, afwijkingen bij de baby en een verlengde zwangerschap en arbeid**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

De baby kan **ongewenste effecten** ondervinden van het acetylsalicylzuur.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en acetylsalicylzuur + vitamine C wil gebruiken.

Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Acetylsalicylzuur + vitamine C kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht

worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- geneesmiddelen die het **vormen van bloedklonters tegengaan** (bloedverdunners);
- sommige **ontstekingsremmers**;
- sommige geneesmiddelen bij **depressie en stemmingsstoornissen**;
- **methotrexaat**, een geneesmiddel bij kanker, psoriasis of reuma;
- **een vaccin tegen windpokken**;
- **acetazolamide**, een geneesmiddel bij een te hoge oogdruk en de preventie van hoogteziekte;
- **deferoxamine**, een geneesmiddel om een teveel aan ijzer en aluminium uit het lichaam te verwijderen.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik acetylsalicylzuur + vitamine C niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een (voorgeschiedenis van) **maagbloeding of darmbloeding**;
- bij een (voorgeschiedenis van) **maagzweer of darmzweer**;
- als je een **bloedstollingsstoornis** hebt;
- kinderen **jonger dan 16 jaar**: enkel op medisch advies;
- kinderen **jonger dan 12 jaar** met een (vermoeden van) **virale infectie**, zoals de griep of waterpokken;
- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- als je een **operatie** of een ingreep aan de **tanden** moet ondergaan.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van acetylsalicylzuur + vitamine C, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.