



Belangrijk om te weten

- Als je een **jichtaanval** hebt, zal **allopurinol niet helpen**. Allopurinol zorgt er alleen voor dat je **minder snel een jichtaanval** krijgt.
- Deze behandeling mag **niet worden opgestart** tijdens een **jichtaanval**.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof allopurinol zijn **geneesmiddelen tegen jicht**. Ze voorkomen de **vorming van urinezuur**.

Jicht is een afzetting van urinezuur in de gewrichten.

Je arts schrijft allopurinol voor om **jichtaanvallen of andere complicaties als gevolg van een teveel aan urinezuur in het bloed te voorkomen**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die allopurinol bevatten. Je ziet er hoeveel allopurinol ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek met je arts, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

De behandeling zal aan een lage dosis worden opgestart. Je arts zal de dosis dan geleidelijk aan verhogen.

Je **mag niet meer innemen dan 600 mg (milligram) per dag** (24 uur), in één tot twee innames per dag. Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem allopurinol in **net na de maaltijd**, zo heb je minder risico op maag- of darmklachten.

Drink voldoende tijdens je behandeling met allopurinol (2 tot 3 liter water per dag).

Kijk op het etiket van de apotheker om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je allopurinol moet innemen.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Bespreek met je arts hoelang je allopurinol moet gebruiken.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van allopurinol zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- veel schildklierhormonen in het bloed;
- huidreacties.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- diarree, misselijkheid, braken;
- stijging van het gehalte aan leverenzymen in het bloed;
- ontsteking van je lever.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met allopurinol niet zomaar zonder medisch advies stoppen.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis allopurinol wanneer het je invalt, of pas op het volgende voorziene tijdstip als het hiervoor bijna tijd is.

Neem **nooit een dubbele dosis** allopurinol om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Je kan volgende klachten krijgen:

- misselijkheid;
- overgeven;
- diarree;

- duizeligheid;
- huidreacties;
- koorts;
- ontsteking van je lever;
- mindere werking van je nieren.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je allopurinol gebruikt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je allopurinol gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op allopurinol.

Je drinkt wel beter met mate. Alcohol kan namelijk een jichtaanval veroorzaken.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je allopurinol gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op allopurinol.

Volg de dieetrichtlijnen bij jicht (beperk rood vlees, wild, orgaanvlees, vis, zeevruchten en frisdrank) en **drink voldoende** tijdens je behandeling met allopurinol (2 tot 3 liter water per dag).



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Het gebruik van allopurinol wordt **afgeraden voor zwangere vrouwen (vooral tijdens het eerste trimester van de zwangerschap) en voor vrouwen die borstvoeding geven.**

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Nee, je mag allopurinol niet gebruiken tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Er is een risico op **schadelijke effecten op je baby**.

Over het gebruik van allopurinol vanaf de derde maand van de zwangerschap is **onvoldoende bekend** om zeker te zijn dat het veilig is. Weeg daarom samen met je arts de ernst van je klachten af tegen het risico voor het kind.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van allopurinol met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van allopurinol wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding**.

Over het gebruik van allopurinol tijdens de borstvoeding is **onvoldoende bekend** om zeker te zijn dat het veilig is.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en allopurinol moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Allopurinol kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige antibiotica uit de familie van de **penicillines**;
- **mercaptapurine**, een geneesmiddel bij kanker;
- **azathioprine**, een geneesmiddel die de immuniteit beïnvloedt.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik allopurinol in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie).

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van allopurinol, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: '[Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?](#)'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 - 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

