Amoxicilline + Clavulaanzuur

Werkzame stof

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Belangrijk om te weten

- Gebruik **geen amoxicilline + clavulaanzuur** als je **allergisch** bent voor **penicillines**.
- Je kan last krijgen van **misselijkheid en diarree** door amoxicilline + clavulaanzuur.
- Blijf amoxicilline + clavulaanzuur innemen **zolang je arts heeft gezegd**, ook als je je al vroeger beter voelt.

Als je arts antibiotica voorschrijft, is het belangrijk dat je de voorgeschreven behandeling nauwkeurig volgt. Alleen zo ben je zeker dat alle bacteriën vernietigd zullen worden en vermijd je de selectie van resistente bacteriën. Hier kan je meer informatie vinden over een correct gebruik van antibiotica.

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof amoxicilline + clavulaanzuur zijn **antibiotica**. Een bacterie kan **ongevoelig** worden voor antibiotica waardoor dit dan niet meer werkt. **Clavulaanzuur** zorgt ervoor dat dit minder snel zal gebeuren.

Je arts schrijft amoxicilline voor bij **infecties** in verschillende delen van je lichaam, die veroorzaakt worden door **bacteriën.**

Typische infecties waarbij je arts amoxicilline + clavulaanzuur voorschrijft, zijn infecties van

- de lage luchtwegen;
- de oren;
- de sinussen;
- de urinewegen;
- de tanden;
- de gewrichten.

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op FarmaInfo.be.

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die amoxicilline + clavulaanzuur bevatten. Je ziet er hoeveel amoxicilline + clavulaanzuur ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

De **algemene dosering van amoxicilline**, vind je terug bij Amoxicilline en bij Amoxicilline voor kinderen.

Je mag **niet meer innemen dan 6 g (gram) amoxicilline per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

> *Bijvoorbeeld: de siroop die 125 mg amoxicilline per 5 ml bevat, heeft 25 mg amoxicilline per ml. De 6000 mg (6 gram) **per dag** komt dan overeen met 240 ml (milliliter) van de siroop.*

De dosering voor kinderen, of bij personen die minder wegen dan 40 kg, vind je terug in Amoxicilline + clavulaanzuur voor kinderen.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem amoxicilline + clavulaanzuur in **tijdens of net na de maaltijd**, zo heb je minder risico op maag- of darmklachten.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten hoeveel keer per dag je amoxicilline + clavulaanzuur moet innemen. Wacht altijd **minstens 4 uur** tussen twee innames.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Blijf amoxicilline + clavulaanzuur innemen **zolang je arts heeft gezegd**, ook als je je al vroeger beter voelt. Je hebt **elke dosis nodig** om de infectie te bestrijden. Als je vroeger stopt, kunnen sommige bacteriën overleven en kan de infectie terugkeren.

Heb je ondanks het gebruik van amoxicilline + clavulaanzuur nog evenveel of zelfs meer last van klachten? Neem dan **contact op met je arts**.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een zeldzame, maar mogelijk ernstige allergische reactie:

- zwelling van je gezicht, lippen, tong;
- moeilijker kunnen ademen;
- koorts;
- pijn in je lichaam.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van zeldzame, maar mogelijk ernstige huidreacties:

- uitslag en jeuk van je huid;
- rode, ronde vlekjes onder je huid;
- blauwe plekjes.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van amoxicilline + clavulaanzuur zijn de volgende:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op 10 mensen)

- diarree.

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- een gistinfectie in de huidplooien, vagina of mond (spruw);
- misselijkheid en braken.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- uitslag op je huid, jeuk;
- verhoogde bulten op je huid die jeuken;
- duizeligheid en hoofdpijn;
- spijsverteringsproblemen.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het FAGG.

Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met amoxicilline + clavulaanzuur niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

Je hebt **elke voorgeschreven dosis nodig** om de infectie te bestrijden. Als je vroeger stopt, kunnen sommige bacteriën overleven en kan de infectie terugkeren.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je vergeten dosis amoxicilline + clavulaanzuur in **wanneer het je invalt**. **Wacht** daarna zeker **4 uur** voor de inname van de volgende dosis. **Contacteer je arts** als je nog **vragen** zou hebben over het vervolg van je behandeling.

Neem **nooit een dubbele dosis** amoxicilline + clavulaanzuur om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- misselijkheid;
- braken;
- diarree;
- epilepsie aanvallen (convulsies).

Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je amoxicilline + clavulaanzuur gebruikt, **behalve** als je je **duizelig** voelt.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je amoxicilline + clavulaanzuur gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op amoxicilline + clavulaanzuur.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je amoxicilline + clavulaanzuur gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op amoxicilline + clavulaanzuur.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Amoxicilline + clavulaanzuur is veilig voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die borstvoeding geven.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Ja, je mag amoxicilline + clavulaanzuur gebruiken tijdens de zwangerschap. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van amoxicilline + clavulaanzuur met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag amoxicilline + clavulaanzuur gebruiken als je borstvoeding geeft. Er zijn **geen negatieve effecten bekend**.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en amoxicilline + clavulaanzuur moet gebruiken.

Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Amoxicilline + clavulaanzuur kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- methotrexaat, een geneesmiddel bij kanker, psoriasis of reuma;
- allopurinol, een geneesmiddel bij jicht;
- geneesmiddelen die het **vormen van bloedklonters tegengaan** (bloedverdunners).

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik amoxicilline + clavulaanzuur niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je **allergisch** bent voor de **groep antibiotica** waartoe amoxicilline behoort (de **penicillines**);
- bij ernstige **leverproblemen**;
- bij ernstige **nierproblemen** of als je **moeilijk kan plassen**;
- als je een **hoge bloeddruk** hebt en/of een **zoutarm dieet** moet volgen: gebruik dan geen bruistabletten.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van amoxicilline + clavulaanzuur, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik hier voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Noteer hier al je vragen voor je arts, apotheker of andere zorgverlener.

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.