Amoxicilline voor kinderen

Werkzame stof

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Belangrijk om te weten

- Gebruik **geen amoxicilline** als je kind **allergisch** is voor **penicillines**.
- Je kind kan last krijgen van **misselijkheid en diarree** door amoxicilline.
- Blijf amoxicilline geven aan je kind **zolang je arts heeft gezegd**, ook als je kind zich al vroeger beter voelt.

Wees steeds voorzichtig en waakzaam als je je kind een geneesmiddel toedient. Hier vind je enkele zaken waar je op moet letten en tips om geneesmiddelen goed te gebruiken bij kinderen.

Als je arts antibiotica voorschrijft, is het belangrijk dat je de voorgeschreven behandeling nauwkeurig volgt. Alleen zo ben je zeker dat alle bacteriën vernietigd zullen worden en vermijd je de selectie van resistente bacteriën. Hier kan je meer informatie vinden over een correct gebruik van antibiotica.

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof amoxicilline zijn **antibiotica.**

Typische infecties waarbij je arts amoxicilline voorschrijft, zijn infecties van:

- van de lage luchtwegen;
- van de oren;
- van de sinussen.

Amoxicilline wordt ook voorgeschreven bij de ziekte van Lyme of als combinatiebehandeling bij een maagzweer.

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op FarmaInfo.be.

Niet alle vormen zijn geschikt voor je kind.

Bespreek met je arts of apotheker welk geneesmiddel het meest geschikt is voor je kind.

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die amoxicilline bevatten. Je ziet er hoeveel amoxicilline ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast amoxicilline nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een nieuwe zoekopdracht uit.

Hoe gebruikt mijn kind dit geneesmiddel? - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag mijn kind van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je kind moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter.**

De arts zal de dosering voor je kind bepalen op basis van het **type van de infectie** en het **lichaamsgewicht**.

Je kind mag **niet meer innemen dan 100 mg (milligram) per kg (kilogram) lichaamsgewicht per dag** (24 uur), tenzij je arts dit anders voorschrijft. Deze maximale dosis mag ook **nooit meer zijn dan 1 g (gram) per keer**.

> *Bijvoorbeeld: je kind weegt 10 kg. Je mag 10 x 100 mg = 1000 mg (1 gram) geven **per dag**. De siroop die 500 mg amoxicilline per 5 ml bevat, heeft 100 mg amoxicilline per ml. De 1000 mg **per dag** komt dan overeen met 10 ml (milliliter) van de siroop.*

Op welk tijdstip gebruikt mijn kind dit geneesmiddel?

Geef je kind amoxicilline in **tijdens of net na de maaltijd**, zo heeft je kind minder risico op maag- of darmklachten.

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten hoeveel keer per dag je kind amoxicilline moet innemen. Wacht altijd **minstens 4 uur** tussen twee dosissen.

Hoelang mag mijn kind dit geneesmiddel gebruiken?

Blijf amoxicilline geven aan je kind **zolang je arts heeft gezegd**, ook als je kind zich al vroeger beter voelt. Je kind heeft **elke dosis nodig** om de infectie te bestrijden. Als je vroeger stopt, kunnen sommige bacteriën overleven en kan de infectie terugkeren.

Heeft je kind ondanks het gebruik van amoxicilline nog evenveel of zelfs meer last van klachten? Neem dan **contact op met je arts**.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van een zeldzame, maar mogelijk ernstige allergische reactie:

- zwelling van het gezicht, de lippen en de tong;
- moeilijker kunnen ademen;
- koorts;
- pijn in het lichaam.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden, want dit zijn de symptomen van zeldzame, maar mogelijk ernstige huidreacties:

- uitslag en jeuk van de huid;
- rode, ronde vlekjes onder de huid;
- blauwe plekjes.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van amoxicilline zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- uitslag op de huid;
- misselijkheid;
- diarree.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- braken.

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je kind last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het FAGG.



Mag mijn kind zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met amoxicilline niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

Je kind heeft **elke voorgeschreven dosis nodig** om de infectie te bestrijden. Als je vroeger stopt, kunnen sommige bacteriën overleven en kan de infectie terugkeren.



Wat moet ik doen als mijn kind een dosis is vergeten of te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt?

Wat als mijn kind een dosis is vergeten?

Geef de vergeten dosis amoxicilline **wanneer het je invalt. Wacht** daarna zeker **4 uur** voor de volgende dosis. **Contacteer je arts** als je nog **vragen** zou hebben over het vervolg van de behandeling.

Geef je kind **nooit een dubbele dosis** amoxicilline om een vergeten dosis in te halen.

Wat als mijn kind te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kind kan volgende klachten krijgen:

- misselijkheid;
- braken;
- diarree;
- troebele urine;
- problemen bij het plassen.



Mag mijn kind alles eten en drinken als het dit geneesmiddel gebruikt?

Ja, je kind mag alles eten en drinken als het amoxicilline gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van voedsel op amoxicilline.

Waarop moet ik letten als mijn kind nog andere geneesmiddelen gebruikt?

Amoxicilline kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. Je moet voorzichtig zijn wanneer je kind amoxicilline gelijktijdig gebruikt met andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je kind dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- **methotrexaat**, een geneesmiddel bij kanker, psoriasis of reuma;
- **allopurinol**, een geneesmiddel bij jicht;
- geneesmiddelen die het **vormen van bloedklonters tegengaan** (bloedverdunners).

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als mijn kind nog andere gezondheidsproblemen heeft?

Geef amoxicilline niet aan je kind in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- als je **allergisch** bent voor de **groep antibiotica** waartoe amoxicilline behoort (de **penicillines**);
- bij ernstige **nierproblemen** of als je **moeilijk kan plassen**;
- als je een **hoge bloeddruk** hebt en/of een **zoutarm dieet** moet volgen: gebruik dan geen bruistabletten.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van amoxicilline, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Een **poeder voor orale suspensie** moet eerst **bereid worden door de apotheker**. Indien je dit zelf zou willen doen, raadpleeg dan de bijsluiter. Na de bereiding moet de suspensie bewaard worden in de **koelkast** (2 – 8°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik hier voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Sommige **siropen** zijn maar **beperkt houdbaar na opening**, bekijk hiervoor de bijsluiter.

Noteer hier al je vragen voor je arts, apotheker of andere zorgverlener.

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.