



Belangrijk om te weten

- Gebruik **geen naproxen** tijdens het **derde trimester** van je **zwangerschap**.
- Drink best **geen alcohol** wanneer je naproxen gebruikt.



Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof naproxen zijn **ontstekingsremmers**.

Je arts schrijft naproxen voor bij **pijn in de spieren, gewrichten en pezen of bij pijn tijdens de menstruatie**.



Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op [FarmaInfo.be](https://www.farmainfo.be).

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die naproxen bevatten. Je ziet er hoeveel naproxen ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen die naast naproxen nog andere werkzame stoffen bevatten. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een [nieuwe zoekopdracht](#) uit.



Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek met je arts, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Naproxen wordt voorgeschreven aan **volwassenen**. Onder strikte medische begeleiding kunnen ook jongere personen naproxen gebruiken.

Je mag **niet meer innemen dan 1 g (gram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten op welk tijdstip en hoeveel keer per dag je naproxen moet innemen.

Neem naproxen in **tijdens of net na de maaltijd**, zo heb je minder risico op maag- of darmklachten.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Bespreek met je arts hoelang je naproxen moet gebruiken.

Gebruik naproxen zo kort mogelijk. Als de klachten van pijn verdwenen zijn, stop dan met het gebruik van naproxen.

Je arts zal je pijn opvolgen en beslissen hoelang je naproxen mag gebruiken.



Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van naproxen zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- hoofdpijn;
- duizeligheid;
- slaperigheid;
- misselijkheid;
- verstopping van de darmen (constipatie);
- buikpijn;
- maagzuur;
- winderigheid;
- gezichtsstoornissen;
- vochtophoping (oedeem);
- oorsuizen;
- kortademigheid.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- ontstekingen in de mond, aften;
- bloedverlies in je maag of darmen;
- duizeligheid;
- gehoorstoornissen;
- snelle hartslag;
- eetstoornissen, diarree, braken;
- dorst;
- bloeditstoringen onder de huid;
- zweten;
- gevoelsstoornissen.

Naproxen kan je **huid gevoeliger maken voor zonlicht**. Daardoor kan je huid sneller verbranden en blaren krijgen. **Bescherm daarom je huid tegen zonlicht**. Hoe je dit kan doen, kan je lezen in het thema [‘Opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen’](#). Gelukkig komt deze bijwerking niet veel voor, maar voorkomen is altijd beter dan genezen!

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: ‘Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?’. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks [melden aan het FAGG](#).



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Goed idee dat je wil stoppen. **Ja**, je kan in één keer stoppen met het gebruik van naproxen. Als je symptomen verdwenen of niet meer hinderlijk zijn, doe je dit **best zo snel mogelijk**.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je volgende dosis naproxen wanneer het je invalt, of pas op het **volgende voorziene tijdstip** als het hiervoor bijna tijd is.

Neem **nooit een dubbele dosis** naproxen om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker** of bel het **Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- slaperigheid;
- buikpijn;
- maagzuur;
- misselijkheid;
- het niet meer kunnen herkennen van mensen en dingen, het niet weten waar je bent of het niet begrijpen van tijd (desoriëntatie);
- braken.



Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je naproxen gebruikt, **behalve** als je last hebt van:

- slaperigheid;
- duizeligheid;
- vermoeidheid;
- gezichtsproblemen;
- evenwichtsproblemen;
- depressie;
- slaapstoornissen.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je een **voertuig besturen of machines bedienen**, maar **blijf altijd voorzichtig**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Drink best **geen alcohol** wanneer je naproxen gebruikt.

Alcohol versterkt de maag- en darmklachten van naproxen, waardoor het risico op een **maag- of darmbloeding** toeneemt.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je naproxen gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op naproxen.



Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Het gebruik van naproxen wordt **afgeraden voor zwangere vrouwen tijdens het eerste en tweede trimester en voor vrouwen die borstvoeding geven.**

Gebruik geen naproxen tijdens het derde trimester van je zwangerschap.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van naproxen tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Gebruik geen naproxen tijdens het derde trimester van je zwangerschap.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van naproxen met je **arts of je apotheker.**

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Het gebruik van naproxen wordt **afgeraden tijdens een periode van borstvoeding.**

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en naproxen moet gebruiken.



Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Naproxen kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- sommige **ontstekingsremmers**;
- ontstekingsremmers zoals **cortisone** (corticoïden);
- sommige geneesmiddelen bij **epilepsie**;
- sommige geneesmiddelen tegen **suikerziekte** (diabetes mellitus);
- sommige geneesmiddelen bij een **hoge bloeddruk**;
- sommige geneesmiddelen bij een **mindere werking van het hart** (hartfalen);
- sommige **diuretica** (zogenaamde “plaspillen”);
- sommige geneesmiddelen bij een **schimmelinfectie**;
- sommige **antibiotica**;
- sommige geneesmiddelen tegen **aids**;
- sommige geneesmiddelen bij **depressie**;
- **ciclosporine**, een geneesmiddel bij orgaantransplantatie;
- **tacrolimus**, een geneesmiddel gebruikt bij transplantaties om afstoting van een orgaan tegen te gaan;
- **methotrexaat**, een geneesmiddel bij kanker, psoriasis of reuma;
- **lithium**, een geneesmiddel bij manie of depressie.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek:

'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik naproxen niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij een **mindere werking van de nieren** (nierinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van de lever** (leverinsufficiëntie);
- bij een **mindere werking van het hart** (hartfalen);
- bij een **maagzweer** of **darmzweer**;
- als je heel erg **uitgedroogd** bent, bijvoorbeeld door veel diarree, overgeven of te weinig drinken;
- bij een **darmontsteking** (ziekte van Crohn);
- bij **bloedingen** (let op voor bloed in de stoelgang en bij braken);
- bij **windpokken**.

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van naproxen, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

